



Κατάλογος σύνθετων ζωοτροφών

	ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΕΣ	6
	ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ	18
	ΚΟΥΝΕΛΟΤΡΟΦΕΣ	32
	ΒΟΟΤΡΟΦΕΣ	38
	ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΣ	44
	ΑΛΟΓΟΤΡΟΦΕΣ	50
	ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΣ	54
	ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ	58
	ΕΛΑΙΟΠΙΤΑ	66



Οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους στα αλεύρα στο λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη το 1928. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας καταστράφηκαν ολοσχερώς το 1941, στη διάρκεια του πολέμου και μια σύγχρονη για την εποχή της μονάδα άρχισε να λειτουργεί πάλι, στην ίδια θέση, για την παραγωγή αλεύρων, το 1953.

Το 1975, η εταιρία λειτούργησε ένα νέο εργοστάσιο για την παραγωγή Ζωοτροφών ώστε να καλύψει τις ανάγκες της κτηνοτροφίας του νησιού. Έως σήμερα έχει διανύσει σημαντική πορεία και εξέλιξη, τόσο στις τεχνολογικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται, όσο και στην ποιοτική βελτίωση και την εξειδίκευση σε ζωοτροφές. Το 2008 πραγματοποιείται αλλαγή στον αναμείκτη (feed mixer) και λειτούργησαν ζυγός με αυτόματη σακοτροφοδοσία και feed conditioner για παστερίωση και εξυγίανση των τροφών από παθογόνους μικροοργανισμούς. Σχεδιάστηκε ακόμα μία νέα γραμμή κοσκινίσματος, πραγματοποιήθηκε αλλαγή του φίλτρου παραλαβής ζωοτροφών, πλήρης αλλαγή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αυτοματισμού του εργοστασίου αλλά και εγκατάσταση συστήματος ιχνηλασιμότητας (καταγραφή παραγωγής batch στον αναμείκτη). Το 2011 πραγματοποιήθηκε γραμμή καθαρισμού της πυρήνας για την παραγωγή ελαιάλευρου και βιομάζας. Το 2012 σχεδιάζεται μία νέα γραμμή παραγωγής ατμού και γίνεται αντικατάσταση του μαζούτ από βιομάζα.

Η εξειδίκευση σε τροφές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κτηνοτρόφων αλλά και στη νέα πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί, οδήγησε την εταιρία από νωρίς στην παραγωγή ζωοτροφών προερχόμενων αποκλειστικά από φυτικές πρώτες ύλες μη γενετικά τροποποιημένες, αλλά και στην παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών. Οι πρώτες ύλες συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά τόσο από το ΜΑΙΧ (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων) όσο και από τα ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι Μύλοι Κρήτης εξειδικεύονται στην παραγωγή μίας πλήρους γκάμας ζωοτροφών για μηρυκαστικά (αιγοπρόβατα, αγελάδες, μοσχάρια), για πτηνά (κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, κότες αυγοπαραγωγής, τροφές για θηραματικά πτηνά (πέρδικες, ορτύκια, φασιανοί)), για κουνέλια, χοίρους, άλογα, σαλιγκάρια, αλλά και παραγωγή βιολογικών τροφών. Ακόμα, γίνεται παραγωγή ελαιάλευρου και εξειδικευμένων πρώτων υλών (oliveleic) καθώς και εξειδικευμένων πρέμιξ (π.χ πρέμιξ AROMA με αιθέριο έλαιο εσπεριδοειδών, THERPAX μυκοδεσμευτικό με χαρούπι και Ατταπουλγίτη κ.α).

• Εμπειρία από το 1975

- Σύγχρονος εξοπλισμός • Τεχνική Υποστήριξη • Σταθερή ποιότητα προϊόντων
- Πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων • Συνεχής Έρευνα και Ανάπτυξη • Σύγχρονο εργαστήριο
- Προϊόντα προσαρμοσμένα στον πελάτη • Οικονομίες κλίμακας • Αξιοποίηση τοπικών υποπροϊόντων
 - Γρήγορη και ευέλικτη λήψη αποφάσεων • Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
 - Συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων • Αξιοποίηση ελληνικών πρώτων υλών
 - Προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από φυτικές πρώτες ύλες
 - Συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις για τη συμπαραγωγή πρώτων υλών





Ποιοτικός έλεγχος

Η μεγάλη έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών, η τεχνολογική καινοτομία, η εξειδίκευση, η επιστημονική γνώση, η εμπειρία, η ευελιξία και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, καθιστούν τους Μύλους Κρήτης έναν από τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς παραγωγούς ζωοτροφών, προσφέροντας προϊόντα που εγγυώνται τη φυσική διατροφή και τη βέλτιστη απόδοση της εκτροφής.

Ο ποιοτικός έλεγχος των ζωοτροφών αποτελεί το πρώτο, απολύτως αναγκαίο, βήμα κατά την κατάρτιση των σιτηρεσίων των ζώων. Έτσι, προσδιορίζεται η περιεκτικότητα των ζωοτροφών σε θρεπτικά συστατικά, αντιδιαιτητικούς παράγοντες, ανεπιθύμητες ουσίες ή κατάλοιπα. Εκτιμάται η καταλληλότητα για τη χρησιμοποίησή τους στη διατροφή και τίθενται οι περιορισμοί για την ενδεδειγμένη χρήση τους, ώστε τα υπό κατάρτιση σιτηρέσια να είναι ισόρροπα. Με την ισορροπημένη διατροφή των ζώων αναπτύσσεται το παραγωγικό τους δυναμικό, διασφαλίζεται η υγεία και επιμηκύνεται η διάρκεια της παραγωγικής τους ζωής, βελτιώνεται η ποιότητα και η βιολογική αξία των ζωικών προϊόντων. Στα πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστήρια των Μύλων Κρήτης, διενεργούνται καθημερινοί έλεγχοι τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στα τελικά προϊόντα πριν αυτά τεθούν προς διάθεση.

Σήμερα η προσπάθεια για διασφάλιση της ποιότητας έχει πλέον επεκταθεί και στο χώρο παραγωγής. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας και παραγωγής ασφαλών και υγιεινών τελικών προϊόντων, ενώ ο έλεγχος έχει επεκταθεί σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Στα πλαίσια των παραπάνω αρχών, οι Μύλοι Κρήτης εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα:

- **ISO 9001: 2008** - Διασφάλιση Ποιότητας το οποίο προδιαγράφει τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου στα στάδια παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης, πώλησης και εξυπηρέτησης μετά την πώληση και
- **ISO 22000: 2005** - Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP)
- **GR-BIO-13**: Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων



Φροντίδα για το Περιβάλλον

Οι Μύλοι Κρήτης οργανώνουν την παραγωγή τους με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Διαθέτουν σύστημα ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας, έχει αντικατασταθεί το μαζούτ της γραμμής παραγωγής ατμού από βιοκαύσιμο και η παραγωγή αυτού γίνεται από τον πυρήνα της ελιάς. Ακόμα, αξιοποιούνται υποπροϊόντα πυρηνελαιουργείας για την παραγωγή βιοκαύσιμου και ελαιάλευρου αλλά και υποπροϊόντων χυμοποίησης εσπεριδοειδών για την παραγωγή πούλπας εσπεριδοειδών, μελάσσας και αιθέριων ελαίων για χρήση στις ζωοτροφές. Τέλος, διενεργούνται απεντομώσεις μέσω θερμικών μεθόδων.





ΠΚ-1

για αιγοπρόβατα υψηλής γαλακτοπαραγωγής

Η **ΠΚ-1** προορίζεται για τη διατροφή των Αιγοπροβάτων, Υψηλής Γαλακτοπαραγωγής. Χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν τα Αιγοπρόβατα στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	17,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	4,00
Ινώδεις ουσίες	11,00
Τέφρα	8,50
Ασβέστιο	1,00
Φώσφορος	0,70
Νάτριο	0,65
Βιταμίνη Α UI/Kg	5.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.500,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	50,0

Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής εντεροτοξιναιμίας, δύο φορές το χρόνο. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

- Α. Σανό Ψυχανθών (Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος, Μπιζέλι,) Άχυρο.
Ελάχιστη Ημερήσια Ποσότητα: 1 κιλό ή Φρέσκα Χόρτα,
βόσκηση. Ελάχιστη εκτιμώμενη ημερήσια ποσότητα: 4 κιλά
Β. Να δίνετε επιπλέον καθημερινά την τροφή ΠΚ-1

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΠΚ-1

ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 1 ^{ος} - 3 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	0-400 ΓΡΑΜΜ.
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 4 ^{ος} ΚΑΙ 5 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	400-600 ΓΡΑΜΜ.
ΓΑΛΟΥΧΙΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	1.300-1.700 ΓΡΑΜΜ.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1000 - 1200 ΓΡΑΜΜ./ΗΜΕΡΑ	900-1.100 ΓΡΑΜΜ.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 600 - 900 ΓΡΑΜΜ./ΗΜΕΡΑ	500-800 ΓΡΑΜΜ.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 200 - 500 ΓΡΑΜΜ./ΗΜΕΡΑ	150-400 ΓΡΑΜΜ.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Κριθάρι, Πίτυρα Σίτου, Άλευρο Ηλιόσπορου, Ελαιάλευρο, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Άλευρο Σόγιας, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

40
κιλά



ΠΚ - 2

για αιγοπροβάτα πολύ υψηλής γαλακτοπαραγωγής

Η **ΠΚ-2** προορίζεται για την Διατροφή των Αιγοπροβάτων Πολύ Υψηλής Γαλακτοπαραγωγής. Χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν τα Αιγοπρόβατα στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	18,50
Ολικές λιπαρές ουσίες	4,00
Ινώδεις ουσίες	11,00
Τέφρα	8,50
Ασβέστιο	1,00
Φώσφορος	0,70
Νάτριο	0,65
Βιταμίνη Α UI/Kg	5.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.500,0
Βιταμίνη Ε (α -Τοκοφερόλη) UI/Kg	50,0

Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής εντεροτοξιναιμίας, δύο φορές το χρόνο. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Α. Σανό Ψυχανθών (Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος, Μπιζέλι,) Άχυρο.
Ελάχιστη Ημερήσια Ποσότητα: 1 κιλό ή Φρέσκα Χόρτα, βόσκηση. Ελάχιστη εκτιμώμενη ημερήσια ποσότητα: 4 κιλά

Β. Να δίνετε επιπλέον καθημερινά την τροφή ΠΚ-2

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ	ΠΚ-2
ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 1 ^{ος} - 3 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	0-400 GRAMM.
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 4 ^{ος} ΚΑΙ 5 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	300-500 GRAMM.
ΓΑΛΟΥΧΙΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	1.200-1.600 GRAMM.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1000 - 1200 GRAMM./ΗΜΕΡΑ	800-1.000 GRAMM.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 600 - 900 GRAMM./ΗΜΕΡΑ	400-700 GRAMM.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 200 - 500 GRAMM./ΗΜΕΡΑ	100-300 GRAMM.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Κριθάρι, Πίτυρα Σίτου, Άλευρο Ηλιόσπορου, Ελαιάλευρο, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Άλευρο Σόγιας, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.



40
κιλό





ΠΚ - 4

για αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής

Το **ΠΚ-4** προορίζεται για την Διατροφή των Αιγοπροβάτων Γαλακτοπαραγωγής. Η **ΠΚ-4** χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν τα Αιγοπρόβατα στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	15,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	4,00
Ινώδεις ουσίες	9,00
Τέφρα	8,00
Ασβέστιο	1,00
Φώσφορος	0,70
Νάτριο	0,65
Βιταμίνη Α UI/Kg	5.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.500,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	50,0

Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής εντεροτοξιναιμίας, δύο φορές το χρόνο. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Α. Σανό Ψυχανθών (Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος, Μπιζέλι,) Άχυρο. Ελάχιστη Ημερήσια Ποσότητα: 1 κιλό ή Φρέσκα Χόρτα, βόσκηση. Ελάχιστη εκτιμώμενη ημερήσια ποσότητα: 4 κιλά

Β. Να δίνετε επιπλέον καθημερινά την τροφή ΠΚ-4

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΠΚ-4

ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 1 ^{ος} - 3 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	0-400 GRAMM.
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 4 ^{ος} ΚΑΙ 5 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	500-700 GRAMM.
ΓΑΛΟΥΧΙΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	1.400-1.800 GRAMM.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1000 - 1200 GRAMM./ΗΜΕΡΑ	1.000-1.200 GRAMM.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 600 - 900 GRAMM./ΗΜΕΡΑ	600-900 GRAMM.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 200 - 500 GRAMM./ΗΜΕΡΑ	250-500 GRAMM.

Συστατικά: Πίτυρα Σίτου, Καλαμπόκι, Άλευρο Ηλιόσπορου, Άλευρο Σόγιας, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Κριθάρι, Ελαιάλευρο, Σίτος, Λούπινα, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Λοβοί Χαρουπιών, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία

40
κιλά



ΠΚ - 100

μίγμα για αιγοπρόβατα υψηλής γαλαктоπαραγωγής

Το Μίγμα ΠΚ-100 προορίζεται για τη Διατροφή των Αιγοπροβάτων, Υψηλής Γαλακτοπαραγωγής. Η ΠΚ-100 χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν τα Αιγοπρόβατα στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	16,50
Ολικές λιπαρές ουσίες	4,00
Ινώδεις ουσίες	7,00
Τέφρα	7,50
Ασβέστιο	0,95
Φώσφορος	0,70
Νάτριο	0,65
Βιταμίνη Α UI/Kg	5.500,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.500,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	30,0

Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής εντεροτοξιναιμίας, δύο φορές το χρόνο. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σανό Ψυχανθών (Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος, Μπιζέλι) Άχυρο.
Ελάχιστη Ημερήσια Ποσότητα: 1 κιλό ή Φρέσκα Χόρτα, βόσκηση.
Ελάχιστη εκτιμώμενη ημερήσια ποσότητα: 4 κιλά

Β. Να δίνετε επιπλέον καθημερινά την τροφή ΠΚ-100

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ	ΠΚ-100
ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 1 ^{ος} - 3 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	0-400 ΓΡΑΜΜ.
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 4 ^{ος} ΚΑΙ 5 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	400-600 ΓΡΑΜΜ.
ΓΑΛΟΥΧΙΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	1.300-1.700 ΓΡΑΜΜ.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1000 - 1200 ΓΡΑΜΜ./ΗΜΕΡΑ	900-1.100 ΓΡΑΜΜ.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 600 - 900 ΓΡΑΜΜ./ΗΜΕΡΑ	500-800 ΓΡΑΜΜ.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 200 - 500 ΓΡΑΜΜ./ΗΜΕΡΑ	150-400 ΓΡΑΜΜ.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Κριθάρι, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πίτουρα Σίτου, Άλευρο Σόγιας, Λούπινα, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Σίτος, Ελαιάλευρο, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Λοβοί Χαρουπιών, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.



40
κιλά



ΠΚ - 125

μίγμα για αιγοπρόβατα γαλαктоπαγωγής

Το Μίγμα **ΠΚ-125** προορίζεται για τη Διατροφή των Αιγοπροβάτων, Γαλακτοπαραγωγής. Η **ΠΚ-125** χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν τα Αιγοπρόβατα στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	13,50
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,70
Ινώδεις ουσίες	9,00
Τέφρα	7,00
Ασβέστιο	0,90
Φώσφορος	0,60
Βιταμίνη Α UI/Kg	5.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.500,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	20,0

Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής εντεροτοξιναιμίας, δύο φορές το χρόνο. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σανό Ψυχανθών (Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος, Μπιζέλι,) Άχυρο.
Ελάχιστη Ημερήσια Ποσότητα: 1 κιλό ή Φρέσκα Χόρτα, βόσκηση.
Ελάχιστη εκτιμώμενη ημερήσια ποσότητα: 4 κιλά

Β. Να δίνετε επιπλέον καθημερινά την τροφή ΠΚ-125

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 40-45 Kg ΠΚ-125

ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 1 ^{ος} - 3 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	400-500 ΓΡΑΜΜ.
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 4 ^{ος} ΚΑΙ 5 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	600-900 ΓΡΑΜΜ.
ΓΑΛΟΥΧΙΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	1.000-1.100 ΓΡΑΜΜ.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 800 - 1000 ΓΡΑΜΜ./ΗΜΕΡΑ	800-1.000 ΓΡΑΜΜ.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 500 - 800 ΓΡΑΜΜ./ΗΜΕΡΑ	650-800 ΓΡΑΜΜ.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Πίτουρα Σίτου, Άλευρο Ηλιόσπορου, Κριθάρι, Βρώμη, Λούπινο, Ελαιάλευρο, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Σίτος, Άλευρο Σόγιας, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Λοβοί Χαρουπιών,

40
κιλό





ΠΚ - 60

με σκόνη γάλα για τον απογαλακτισμό των αμνοερίφων

Το **ΠΚ-60** είναι συμπληρωματική τροφή για την περίοδο θηλασμού των Αμνοερίφων. Είναι εμπλουτισμένη με προϊόντα γάλακτος ώστε να έχει υψηλή αφομοιωσιμότητα. Μπορεί να δίνεται η τροφή στα Αμνοερίφια από τη **18^η** ημέρα συμπληρωματικά του θηλασμού. Η αλλαγή της τροφής δεν πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα με τον απογαλακτισμό. Τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τον απογαλακτισμό ή 5 ημέρες μετά τον απογαλακτισμό, μεταβάλουμε σταδιακά τη διατροφή περνώντας από το **ΠΚ-60** στο **ΠΚ-3**. Στο διάστημα αυτό των 5 ημερών μειώνουμε σταδιακά την ποσότητα του **ΠΚ-60** και συμπληρώνουμε με **ΠΚ-3**. Το πρόγραμμα διατροφής που συνδυάζει αρχικά **ΠΚ-60** και στη συνέχεια **ΠΚ-3** πετυχαίνει βαρύτερα Αμνοερίφια σε λιγότερο χρόνο πάχυνσης. Η ποσότητα της τροφής να αυξάνεται σιγά-σιγά κάθε μέρα τις πρώτες 5 ημέρες, για να συνηθίζουν τα ζώα να τρώνε και να μην έχουν λαιμαργία.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	15,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	2,50
Ινώδεις ουσίες	8,50
Τέφρα	7,50
Ασβέστιο	1,10
Φώσφορος	0,45
Νάτριο	0,35
Βιταμίνη Α UI/Kg	9.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.800,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	30,0

Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά της εντεροτοξιναιμίας, δύο φορές το χρόνο. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

Συστατικά: Κριθάρι, Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Ηλιόσπορου, Άλευρο Σόγιας, Ελαιάλευρο, Ψιλά Πίτυρα Σίτου, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Λοβοί Χαρουπιών, Σκόνη Αποκορυφωμένου Γάλακτος, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

40
κιλά



ΠΚ - 3

για την πάχυνση των αμνοερίφων

Το **ΠΚ-3** προορίζεται για την εντατική πάχυνση των Αμνοερίφων. Πρέπει να δίνεται η τροφή στα Αμνοερίφια από τη 15η ημέρα όταν δεν ταΐζετε, πριν το **ΠΚ-3**, την τροφή **ΠΚ-60** :

1ον : για να συνηθίζουν να τρώνε από νωρίς ξηρά τροφή και

2ον : να γίνεται ο απογαλακτισμός πιο εύκολα την 4η με 6η εβδομάδα. Ο απογαλακτισμός πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα γιατί έτσι εκμεταλλευόμαστε το γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης που έχουν τα αμνοερίφια στην ηλικία αυτή. Έτσι πετυχαίνουμε βαρύτερα Αμνοερίφια σε λιγότερο χρόνο πάχυνσης. Επιλέγετε για την πάχυνση Αρσενικά και Μακρόσωμα Θηλυκά Αμνοερίφια. Η ποσότητα της τροφής να αυξάνεται σιγά-σιγά κάθε μέρα τις πρώτες 5 ημέρες, για να συνηθίζουν τα ζώα να τρώνε και να μην έχουν λαιμαργία. Πριν από την τροφή να δίνετε πάντοτε 100-150 γρ. άχυρο ή ξηρό χόρτο (όχι σανό τριφύλλι διότι προκαλεί διάρροιες).

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12.00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	16.00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3.00
Ινώδεις ουσίες	10.00
Τέφρα	9.00
Ασβέστιο	1.50
Φώσφορος	0.50
Νάτριο	0.50
Βιταμίνη Α UI/Kg	5.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.500,0
Βιταμίνη Ε (α -Τοκοφερόλη) UI/Kg	20,0

Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής εντεροτοξιναιμίας, δύο φορές το χρόνο. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Κριθάρι, Πίτουρα Σίτου, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Ελαιάλευρο, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Τριφυλλάλευρο, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Λοβοί Χарουπιών, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία



40
κιλά





ΠΡ - 3511-100

ισορροπιστής για τη διατροφή αιγοπροβάτων γαλαктоπαγωγής
και για την πάχυνση αμνοεριφίων

- Ο Ισορροπιστής **ΠΡ-3511-100** παράγεται σε μορφή Κόκκων.
- Καλύπτει τις ανάγκες σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
- Καλύπτει τις ανάγκες σε μακροστοιχεία.
- Περιέχει ρυθμιστικές ουσίες του pH της μεγάλης κοιλίας.
- Χρησιμοποιείται για την παραγωγή Τροφών ή Μιγμάτων:
 1. Αιγοπροβατοτροφών Γαλαктоπαγωγής.
 2. Αιγοπροβατοτροφών για την Πάχυνση των Αμνοεριφίων.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	11,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	6,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,50
Ινώδεις ουσίες	5,00
Τέφρα	39,50
Ασβέστιο	8,20
Φώσφορος	3,40
Νάτριο	6,50
Μαγνήσιο	0,55
Βιταμίνη Α UI/Kg	100.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	20.000,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	350,0

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΩΝ Ή ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗ ΠΡ-3511-100

ΠΡ-3511-100 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΒΗΤΕΣ ΣΟΓΙΑ ΗΛΙΟΠΙΤΑ ΛΑΔΙ ΦΥΤΙΚΟ = ΤΡΟΦΗ Ή ΜΙΓΜΑ							
100	350	170	150	50	180	20	=1020Kg

Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής εντεροτοξιναιμίας, δύο φορές το χρόνο. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

Συστατικά: Κριθάρι, Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Ηλιόσπορου, Άλευρο Σόγιας, Ελαιάλευρο, Ψιλά Πίτυρα Σίτου, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Λοβοί Χαρουπιών, Σκόνη Αποκορυφωμένου Γάλακτος, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία

40
κιλά







ΒΙΟ ΠΡΟΒ - 14

συμπληρωματική βιολογική αιγοπροβατοτροφή γαλακτοπαραγωγής

Η **ΒΙΟΠΡΟΒ-14** προορίζεται για τη διατροφή των Βιολογικά Εκτρεφόμενων Αιγοπροβάτων Γαλακτοπαραγωγής. Η **ΒΙΟΠΡΟΒ-14** χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν τα Αιγοπρόβατα στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	15,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,00
Ινώδεις ουσίες	5,00
Τέφρα	5,50
Ασβέστιο	0,70
Φώσφορος	0,50
Νάτριο	0,55

Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής εντεροτοξιναιμίας, δύο φορές το χρόνο. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Α. Σανό Ψυχανθών (Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος, Μπιζέλι) Άχυρο.

Ελάχιστη Ημερήσια Ποσότητα: 1 κιλό ή Φρέσκα Χόρτα,

βόσκηση. Ελάχιστη εκτιμώμενη ημερήσια ποσότητα: 4 κιλά

Β. Να δίνετε επιπλέον καθημερινά την τροφή ΒΙΟ ΠΡΟΒ-14

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΒΙΟ ΠΡΟΒ - 14

ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 1 ^{ος} - 3 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	0-200 GRAMM.
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 4 ^{ος} ΚΑΙ 5 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	400-800 GRAMM.
ΓΑΛΟΥΧΙΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1 ^{ος} ΜΗΝΑΣ	900-1.100 GRAMM.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1000 - 1200 GRAMM./ΗΜΕΡΑ	1.000-1.200 GRAMM.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 600 - 900 GRAMM./ΗΜΕΡΑ	600-900 GRAMM.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 200 - 500 GRAMM./ΗΜΕΡΑ	200-500 GRAMM.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Πίτυρα Σίτου, Κριθάρι, Άλευρο Σόγιας, Τριφυλλάλευρο, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Ιχνοστοιχεία.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834 / 2007 πιστοποιείται από τον οργανισμό TÜV Hellas. Συνολικό περιεχόμενο πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης σε βάρος ξηράς ουσίας: 95,80%.

40
κιλά



2

Πτηνοτροφές



0Α - 5

για την πάχυνση των νεοσσών
από την 1η έως τη 15η ημέρα

Το **0Α-5** είναι μια πλήρης τροφή σε αλευρώδη μορφή που προορίζεται για αρχικό στάδιο πάχυνσης των νεοσσών κρεατοπαραγωγής. Η τροφή **0Α-5** χορηγείται κατά βούληση, από την 1η ημέρα έως την ηλικία των 15 ημερών. Ακολουθεί η **0Κ-5** σε μορφή τραχανά έως την ηλικία των 42 ημερών. Από την ηλικία των 42 ημερών και για το υπόλοιπο διάστημα της πάχυνσης χορηγείται κατά βούληση η τροφή **0Κ-6**. Για τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη σφαγή συστήνεται η χορήγηση της τροφής **0Κ-6/622** χωρίς κοκκιδιοστατικό.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	22,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,50
Ινώδεις ουσίες	4,50
Τέφρα	6,50
Ασβέστιο	1,10
Φώσφορος	0,70
Νάτριο	0,20
Λυσίνη	1,40
Μεθειονίνη	0,65
Βιταμίνη Α UI/Kg	10.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.300,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	56,5
3a890 Χλωριούχος Χολίνη mg/Kg	450,0
Νατριούχος λασалоσίδη Α mg/Kg	120,0

Φροντίζετε τα πτηνά να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των πτηνών (Θερμοκρασία, Υγρασία, Αερισμός, τύπος και αριθμός ποτίστρων, τύπος και ικανοποιητικό χώρο στις ταΐστρες, στρωμένη, συνωστισμός κλπ). Ακολουθείτε πάντοτε το Κτηνιατρικό Προληπτικό Πρόγραμμα εμβολιασμών και υγιεινής.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία, Πρόμειγμα Κοκκιδιοστατικού.

20 & 40
κιλό



OK - 5

για την πάχυνση των νεοσσών από τη 15η έως την 42η ημέρα

Το **OK-5** είναι μια πλήρης τροφή σε μορφή τραχανά που προορίζεται για την πάχυνση των νεοσσών κρεατοπαραγωγής. Για την πρώτη περίοδο από την 1η ημέρα έως την ηλικία των 15 ημερών συστήνεται η τροφή **OK-5** σε αλευρώδη μορφή. Ακολουθεί η **OK-5** από την 15η έως τη 42η ημέρα. Από την ηλικία των 42 ημερών και για το υπόλοιπο διάστημα της πάχυνσης χορηγείται κατά βούληση η τροφή **OK-6**. Για τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη σφαγή συστήνεται η χορήγηση της τροφής **OK-6/622** χωρίς κοκκιδιοστατικό.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	21,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	4,00
Ινώδεις ουσίες	3,50
Τέφρα	6,00
Ασβέστιο	0,90
Φώσφορο	0,70
Νάτριο	0,20
Λυσίνη	1,20
Μεθειονίνη	0,55
Βιταμίνη Α UI/Kg	10.200,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.300,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	56,5
3a890 Χλωριούχος Χολίνη mg/Kg	450,0
Νατριούχος λασалоσίδη Α mg/Kg	120,0

Φροντίζετε τα πτηνά να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των πτηνών (Θερμοκρασία, Υγρασία, Αερισμός, τύπος και αριθμός ποτίστρων, τύπος και ικανοποιητικό χώρο στις ταΐστρες, στρωμνή, συνωστισμός κλπ). Ακολουθείτε πάντοτε το Κτηνιατρικό Προληπτικό Πρόγραμμα εμβολιασμών και υγιεινής.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία, Πρόμειγμα Κοκκιδιοστατικού.

15 & 40
κιλά



OK - 6

για την πάχυνση των νεοσσών από την 42η ημέρα

Το **OK-6** είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους που προορίζεται για το τελικό στάδιο πάχυνσης των νεοσσών κρεατοπαραγωγής. Για την πρώτη περίοδο από την 1η ημέρα έως την ηλικία των 15 ημερών συστήνεται η τροφή **OK-5** σε αλευρώδη μορφή και ακολουθεί η **OK-5** σε μορφή τραχανά έως την ηλικία των 42 ημερών. Από την ηλικία των 42 ημερών και για το υπόλοιπο διάστημα της πάχυνσης χορηγείται κατά βούληση η τροφή **OK-6**. Για τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη σφαγή συστήνεται η χορήγηση της τροφής **OK-6/622** χωρίς κοκκιδιοστατικό.

Περιεκτικότητα

	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	19,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	4,00
Ινώδεις ουσίες	4,00
Τέφρα	5,50
Ασβέστιο	0,85
Φώσφορο	0,60
Νάτριο	0,15
Λυσίνη	1,10
Μεθειονίνη	0,50
Βιταμίνη Α UI/Kg	10.200,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.300,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	56,5
Χλωριούχος Χολίνη	450,0
Υδροχλωρική Ρομπενιδίνη mg/Kg	66,0

Φροντίζετε τα πτηνά να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των πτηνών (Θερμοκρασία, Υγρασία, Αερισμός, τύπος και αριθμός ποτίστρων, τύπος και ικανοποιητικό χώρο στις ταΐστρες, στρωμνή, συνωστισμός κλπ). Ακολουθείτε πάντοτε το Κτηνιατρικό Προληπτικό Πρόγραμμα εμβολιασμών και υγιεινής.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία, Πρόμειγμα Κοκκιδιοστατικού.



20 & 40
κιλά





OK - 6 / 622

για την πάχυνση των νεοσσών κίτρινου σφαγίου
μία εβδομάδα πριν τη σφαγή ή από την 70η
ημέρα μέχρι τη σφαγή

Αυτή η Πτηνοτροφή **OK-6/622** είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους (2,50 χιλ.). Προορίζεται για το τελικό στάδιο της πάχυνσης των Νεοσσών Κρεατοπαραγωγής Κίτρινου Σφαγίου που εκτρέφονται σε συστηματικά πτηνοτροφεία ή σε αγροκτήματα. Η τροφή **OK-6/622** δεν περιέχει Κοκκιδιοστατικό και χορηγείται στο τελευταίο στάδιο της πάχυνσης. Χορηγείται για κατά βούληση κατανάλωση. Σε εκτροφές που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με κοκκίδια, μπορεί να χορηγείται η τροφή **OK-6/622** από την ηλικία των 42 ημερών και για το υπόλοιπο διάστημα της πάχυνσης.

Περιεκτικότητα

	%
Υγρασία	12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	17,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,00
Ινώδεις ουσίες	5,00
Τέφρα	5,50
Ασβέστιο	0,85
Φώσφορο	0,70
Νάτριο	0,15
Λυσίνη	1,00
Μεθειονίνη	0,45
Βιταμίνη A UI/Kg	10.200,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.300,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	56,5
Χλωριούχος χολίνη mg/Kg	450,0

Φροντίζετε τα πτηνά να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των πτηνών (Θερμοκρασία, Υγρασία, Αερισμός, τύπος και αριθμός ποτίστρων, τύπος και ικανοποιητικό χώρο στις ταΐστρες, στρωμνή, συνωστισμός κλπ). Ακολουθείτε πάντοτε το Κτηνιατρικό Προληπτικό Πρόγραμμα εμβολιασμών και υγιεινής.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πίτυρα Σίτου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία, Πρόμειγμα Κοκκιδιοστατικού, Πρόμειγμα Φυτικών Χρωστικών.

20 & 40
κιλά



OK-1

για πουλάδες και για την πάχυνση των νεοσσών

Το **OK-1** είναι μια πλήρης τροφή σε μορφή κόκκου που προορίζεται για την ανάπτυξη πουλάδων αυγοπαραγωγής και για την πάχυνση νεοσσών κρεατοπαραγωγής. Ιδανικό για χωρική εκτροφή και παραγωγικές μονάδες ελεύθερας βοσκής. **Α. Πουλάδες που προορίζονται για την παραγωγή αυγών:** Για την ηλικία από την 1η έως την 15η ημέρα συστήνεται η **OA-5** σε αλευρώδη μορφή. Από τη 15η έως την 42η ημέρα χορηγείται η **OK-5**. Από τη 42η ημέρα έως τη 18η εβδομάδα χορηγείται κατά βούληση η **OK-1**. Για τη 19η εβδομάδα συστήνεται η σταδιακή αντικατάσταση της **OK-1** σε **OK-3**. Από την 20η εβδομάδα και για όλη την περίοδο που διαρκεί η αυγοπαραγωγή χορηγείται η **OK-3** κατά βούληση. **Β. Πάχυνση νεοσσών:** Για την ηλικία από την 1η έως τη 15η ημέρα συστήνεται η **OA-5** σε αλευρώδη μορφή. Από τη 15η έως την 42η ημέρα χορηγείται η **OK-5**. Από την ηλικία των 42 ημερών και για το υπόλοιπο διάστημα της πάχυνσης χορηγείται κατά βούληση η **OK-1**. Για τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη σφαγή συστήνεται η χορήγηση της τροφής **OK-6/622** χωρίς κοκκιδιοστατικό.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	20,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,50
Ινώδεις ουσίες	4,50
Τέφρα	6,00
Ασβέστιο	0,90
Φώσφορο	0,75
Νάτριο	0,15
Λυσίνη	1,10
Μεθειονίνη	0,50
Βιταμίνη A UI/Kg	10.200,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.300,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	56,5
Χλωριούχος Χολίνη mg/Kg	450,0
Υδροχλωρική ρομπενιδίνη mg/Kg	66,0

Φροντίζετε τα πτηνά να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των πτηνών (Θερμοκρασία, Υγρασία, Αερισμός, τύπος και αριθμός ποτίστρων, τύπος και ικανοποιητικό χώρο στις ταΐστρες, στρωμνή, συνωστισμός κλπ). Ακολουθείτε πάντοτε το Κτηνιατρικό Προληπτικό Πρόγραμμα εμβολιασμών και υγιεινής.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πίτουρα Σίτου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία, Πρόμειγμα Κοκκιδιοστατικού, Πρόμειγμα Φυτικών Χρωστικών.

40
κιλά



OK - 3

για χωριάτικες κότες αυγοπαραγωγής

Το **OK-3** είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους που προορίζεται για κότες αυγοπαραγωγής και παραγωγικές μονάδες ελευθέρας βοσκής. Χορηγείται κατά βούληση από την ηλικία των 20 εβδομάδων και για όλη την περίοδο που διαρκεί η αυγοπαραγωγή.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	18,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	4,00
Ινώδεις ουσίες	4,00
Τέφρα	12,50
Ασβέστιο	3,70
Φώσφορο	0,60
Νάτριο	0,15
Λυσίνη	0,95
Μεθειονίνη	0,45
Βιταμίνη Α UI/Kg	8.500,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	2.000,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	60,0
Χλωριούχος Χολίνη	500,0

Φροντίζετε τα πτηνά να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των πτηνών (Θερμοκρασία, Υγρασία, Αερισμός, τύπος και αριθμός ποτίστρων, τύπος και ικανοποιητικό χώρο στις ταΐστρες, στρωμνή, συνωστισμός κλπ). Ακολουθείτε πάντοτε το Κτηνιατρικό Προληπτικό Πρόγραμμα εμβολιασμών και υγιεινής.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πίτυρα Σίτου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία, Πρόμειγμα Φυτικών Χρωστικών.

20 & 40
κιλά





BIO OA - 1

για την ανάπτυξη των νεοσσών αυγοπαραγωγής
βιολογικής εκτροφής από την 1η ημέρα έως το
τέλος της 12ης εβδομάδας

Η **BIO OA-1** είναι μια πλήρης τροφή σε Αλεύρι και προορίζεται για την ανάπτυξη των βιολογικά εκτρεφόμενων νεοσσών Αυγοπαραγωγής. Χορηγείται κατά βούληση η **BIO OA-1** από την πρώτη ημέρα μέχρι το τέλος της 12ης εβδομάδας εκτροφής. Από τη 13η εβδομάδα χορηγείται η **BIO OA-2**. Για την 19η εβδομάδα συστήνεται η σταδιακή αντικατάσταση της **BIO OA-2** σε **BIO OA-3**. Από την 20η εβδομάδα και για όλη την περίοδο που διαρκεί η αυγοπαραγωγή χορηγείται η **BIO OA-3** κατά βούληση.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	20,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,00
Ινώδεις ουσίες	4,00
Τέφρα	6,50
Ασβέστιο	1,00
Φώσφορο	0,75
Νάτριο	0,15
Λυσίνη	0,95
Μεθειονίνη	0,45
Βιταμίνη A UI/Kg	10.200,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.300,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	56,5

Φροντίζετε τα πτηνά να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των πτηνών (Θερμοκρασία, Υγρασία, Αερισμός, τύπος και αριθμός ποτίστρων, τύπος και ικανοποιητικό χώρο στις ταΐστρες, στρωμνή, συνωστισμός κλπ). Ακολουθείτε πάντοτε το Κτηνιατρικό Προληπτικό Πρόγραμμα εμβολιασμών και υγιεινής.

Συστατικά: BIO Καλαμπόκι, BIO_ Πίτουρα Σίτου, BIO_ Άλευρο Σόγιας, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834 / 2007 πιστοποιείται από τον οργανισμό TUV Hellas. Συνολικό περιεχόμενο πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης σε βάρος ξηράς ουσίας: 95,80%.



40
κιλά

BIO OA - 2

για την ανάπτυξη των πουλάδων αυγοπαραγωγής
βιολογικής εκτροφής από τη 13η εβδομάδα έως τη
16η/17η εβδομάδα

Η **BIO OA-2** είναι μια πλήρης τροφή σε τραχανά και προορίζεται για την ανάπτυξη των βιολογικά εκτρεφόμενων πουλάδων Αυγοπαραγωγής. Χορηγείται κατά βούληση η **BIO OA-1** από την πρώτη ημέρα μέχρι το τέλος της 12ης εβδομάδος εκτροφής. Από τη 13η εβδομάδα χορηγείται η **BIO OA-2**. Για την 19η εβδομάδα συστήνεται η σταδιακή αντικατάσταση της **BIO OA-2** σε **BIO OA-3**. Από την 20η εβδομάδα και για όλη την περίοδο που διαρκεί η αυγοπαραγωγή χορηγείται η **BIO OA-3** κατά βούληση.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	17,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	4,50
Ινώδεις ουσίες	4,00
Τέφρα	6,00
Ασβέστιο	0,90
Φώσφορο	0,70
Νάτριο	0,15
Λυσίνη	0,90
Μεθειονίνη	0,40
Βιταμίνη A UI/Kg	10.200,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.300,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	56,5

Φροντίζετε τα πτηνά να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των πτηνών (Θερμοκρασία, Υγρασία, Αερισμός, τύπος και αριθμός ποτίστρων, τύπος και ικανοποιητικό χώρο στις ταΐστρες, στρωμνή, συνωστισμός κλπ). Ακολουθείτε πάντοτε το Κτηνιατρικό Προληπτικό Πρόγραμμα εμβολιασμών και υγιεινής.

Συστατικά: BIO Καλαμπόκι, BIO_ Πίτυρα Σίτου, BIO_ Άλευρο Σόγιας, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834 / 2007 πιστοποιείται από τον οργανισμό TUV Hellas. Συνολικό περιεχόμενο πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης σε βάρος ξηράς ουσίας: 95,80%.



40
κιλό



BIO OA - 3

για τις κόττες αυγοπαραγωγής βιολογικής εκτροφής από
την 20η εβδομάδα έως το τέλος της αυγοπαραγωγής

Η **BIO OA-3** είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους που προορίζεται για βιολογικά εκτρεφόμενες κόττες αυγοπαραγωγής. Για την 19η εβδομάδα συστήνεται η σταδιακή αντικατάσταση της **BIO OA-2** σε **BIO OA-3**. Από την 20η εβδομάδα και για όλη την περίοδο που διαρκεί η αυγοπαραγωγή χορηγείται η **BIO OA-3** κατά βούληση.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12.00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	16.50
Ολικές λιπαρές ουσίες	4.00
Ινώδεις ουσίες	3.50
Τέφρα	6.50
Ασβέστιο	1.30
Φώσφορο	0.60
Νάτριο	0.16
Λυσίνη	0.90
Μεθειονίνη	0.25
Βιταμίνη A UI/Kg	8.500,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	2.000,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	60,0

Φροντίζετε τα πτηνά να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των πτηνών (Θερμοκρασία, Υγρασία, Αερισμός, τύπος και αριθμός ποτίστρων, τύπος και ικανοποιητικό χώρο στις ταΐστρες, στρωμνή, συνωστισμός κλπ). Ακολουθείτε πάντοτε το Κτηνιατρικό Προληπτικό Πρόγραμμα εμβολιασμών και υγιεινής.

Συστατικά: BIO Καλαμπόκι, BIO_ Πίτυρα Σίτου, BIO_ Άλευρο Σόγιας, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834 / 2007 πιστοποιείται από τον οργανισμό TUV Hellas. Συνολικό περιεχόμενο πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης σε βάρος ξηράς ουσίας: 96,97%.



40
κιλά



3

Κουνελοτροφές



ΚΚ-2

για θηλυκά που γεννούν έως 8 φορές το χρόνο
και για την πάχυνση και ανάπτυξη των κουνελιών

Το **ΚΚ-2** είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους, η οποία προορίζεται τόσο για μικρές έως μεσαίες συστηματικές όσο και για οικόσιτες εκτροφές. Χορηγείται κατά βούληση σε θηλυκά και αρσενικά αναπαραγωγής, ανάπτυξης και σε παχυνόμενα έως και 5 ημέρες πριν τη σφαγή. Ιδανική για θηλυκά που γεννούν έως 8 φορές το χρόνο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Φυσιολογικά στάδια παραγωγής των κουνελιών	ΚΚ-2
Αρσενικά κουνέλια αναπαραγωγής	40-50γρ/κιλό ζώντος βάρους
Νεαρές κουνελομητέρες	40-50γρ/κιλό ζώντος βάρους
Κουνελομητέρες σε εγκυμοσύνη και θηλασμό	όσο θέλουν (200-400γρ/ημέρα)
Κουνέλια για πάχυνση	όσο θέλουν (150-200γρ / ημέρα)

Η **ΚΚ-2** περιέχει κοκκιδιοστατικό για την πρόληψη της κοκκιδίασης. Για τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη σφαγή συστήνεται η χορήγηση της **ΚΚ-14** χωρίς κοκκιδιοστατικό. Φροντίζετε τα κουνέλια να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των κουνελιών (καθαριότητα, εξαερισμός, απολύμανση και υγιεινή, σωστή διατροφή). Εμβολιάζετε συστηματικά για το Αιμορραγικό Σύνδρομο.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	16,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	5,50
Ινώδεις ουσίες	17,00
Τέφρα	7,50
Ασβέστιο	0,85
Φώσφορο	0,65
Νάτριο	0,20
Βιταμίνη Α UI/Kg	10.800,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.000,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	10,0
Robenidine mg/Kg	66,0

Συστατικά: Πίτουρα Σίτου, Άλευρο Ηλιόσπορου, Τριφυλλάλευρο, Ελαιάλευρο, Κριθάρι, Πούλπα Ζαχαρότευτλων, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Σίτος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Ζύμες, Λοβοί Χαουπιών, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία, Κοκκιδιοστατικό Robenidine.

20 & 40
κιλά



ΚΚ - 9

με χαρουπάλευρο για θηλυκά που γεννούν έως
8 φορές το χρόνο και για την πάχυνση των κουνελιών

Το **ΚΚ-9** είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους, η οποία προορίζεται τόσο για μικρές έως μεσαίες συστηματικές όσο και για οικόσιτες εκτροφές. Χορηγείται κατά βούληση σε θηλυκά και αρσενικά αναπαραγωγής, ανάπτυξης και σε παχυνόμενα έως και 5 ημέρες πριν την σφαγή. Ιδανική για θηλυκά που γεννούν έως 8 φορές το χρόνο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	
Φυσιολογικά στάδια παραγωγής των κουνελιών	ΚΚ-9
Αρσενικά κουνέλια αναπαραγωγής	40-50γρ/κιλό ζώντος βάρους
Νεαρές κουνελομητέρες	40-50γρ/κιλό ζώντος βάρους
Κουνελομητέρες σε εγκυμοσύνη και θηλασμό	όσο θέλουν (200-400γρ/ημέρα)
Κουνέλια για πάχυνση	όσο θέλουν (150-200γρ / ημέρα)

Η τροφή **ΚΚ-9** περιέχει κοκκιδιοστατικό για την πρόληψη της κοκκιδίασης. Για τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη σφαγή συστήνεται η χορήγηση της **ΚΚ-14** χωρίς κοκκιδιοστατικό. Φροντίζετε τα κουνέλια να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των κουνελιών (καθαριότητα, εξαερισμός, απολύμανση και υγιεινή, σωστή διατροφή). Εμβολιάζετε συστηματικά για το Αιμορραγικό Σύνδρομο.

Περιεκτικότητα

	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	16,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	5,50
Ινώδεις ουσίες	17,00
Τέφρα	7,50
Ασβέστιο	0,85
Φώσφορο	0,65
Νάτριο	0,20
Βιταμίνη Α UΙ/Kg	10.800,0
Βιταμίνη D3 UΙ/Kg	1.000,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UΙ/Kg	10,0
Robenidine mg/Kg	66,0

Συστατικά: Πίτυρα Σίτου, Άλευρο Ηλιόσπορου, Κριθάρι, Τριφυλλάλευρο, Ελαιάλευρο, Λοβοί Χαουπιών, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Πούλπα Ζαχαρότευτλων, Σίτος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Ζύμες, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία, Κοκκιδιοστατικό Robenidine.



20 & 40
κιλά

ΚΚ-14

με χαρουπάλευρο, χωρίς κοκκιδιοστατικό για θηλυκά που γεννούν έως 8 φορές το χρόνο και για την πάχυνση των κουνελιών (κατάλληλη για τις τελευταίες μέρες της πάχυνσης)

Το **ΚΚ-14** είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους, η οποία προορίζεται τόσο για μικρές έως μεσαίες συστηματικές όσο και για οικόσιτες εκτροφές. Χορηγείται κατά βούληση σε θηλυκά και αρσενικά αναπαραγωγής, ανάπτυξης και σε παχυνόμενα. Ιδανική για θηλυκά που γεννούν έως 8 φορές το χρόνο. Η τροφή **ΚΚ-14** περιέχει αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα πλούσια σε βιοενεργά συστατικά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	
Φυσιολογικά στάδια παραγωγής των κουνελιών	ΚΚ-14
Αρσενικά κουνέλια αναπαραγωγής	40-50γρ/κιλό ζώντος βάρους
Νεαρές κουνελομητέρες	40-50γρ/κιλό ζώντος βάρους
Κουνελομητέρες σε εγκυμοσύνη και θηλασμό	όσο θέλουν (200-400γρ/ημέρα)
Κουνέλια για πάχυνση	όσο θέλουν (150-200γρ / ημέρα)

Φροντίζετε τα κουνέλια να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των κουνελιών (καθαριότητα, εξαερισμός, απολύμανση και υγιεινή, σωστή διατροφή). Εμβολιάζετε συστηματικά για το Αιμορραγικό Σύνδρομο.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	16,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	5,50
Ινώδεις ουσίες	17,00
Τέφρα	7,50
Ασβέστιο	0,85
Φώσφορο	0,65
Νάτριο	0,20
Βιταμίνη Α UI/Kg	10.800,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.560,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	50,0

Συστατικά: Πίτουρα Σίτου, Άλευρο Ηλιόσπορου, Κριθάρι, Τριφυλλάλευρο, Ελαιάλευρο, Λοβοί Χαρουπιών Πούλπα Εσπεριδοειδών, Πούλπα Ζαχαρότευτλων, Σίτος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Ζύμες, Μπετονίτης, βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

20
κιλό







ΚΚ - 100

για θηλυκά που γεννούν έως 6 φορές το χρόνο
και για την πάχυνση και την ανάπτυξη των κουνελιών

Το **ΚΚ-100** είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους, η οποία προορίζεται τόσο για μικρές έως μεσαίες συστηματικές όσο και για οικόσιτες εκτροφές. Χορηγείται κατά βούληση σε θηλυκά και αρσενικά αναπαραγωγής, ανάπτυξης και σε παχυνόμενα έως και 5 ημέρες πριν την σφαγή. Ιδανική για θηλυκά που γεννούν έως 6 φορές το χρόνο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Φυσιολογικά στάδια παραγωγής των κουνελιών	ΚΚ-100
Αρσενικά κουνέλια αναπαραγωγής	40-50γρ/κιλό ζώντος βάρους
Νεαρές κουνελομητέρες	40-50γρ/κιλό ζώντος βάρους
Κουνελομητέρες σε εγκυμοσύνη και θηλασμό	όσο θέλουν (200-400γρ/ημέρα)
Κουνέλια για πάχυνση	όσο θέλουν (150-200γρ / ημέρα)

Η τροφή **ΚΚ-100** περιέχει κοκκιδιοστατικό για την πρόληψη της κοκκιδίωσης. Για τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη σφαγή συστήνεται η χορήγηση της **ΚΚ-14** χωρίς κοκκιδιοστατικό. Φροντίζετε τα κουνέλια να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης των κουνελιών (καθαριότητα, εξαερισμός, απολύμανση και υγιεινή, σωστή διατροφή). Εμβολιάζετε συστηματικά για το Αιμορραγικό Σύνδρομο.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	16,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	5,50
Ινώδεις ουσίες	17,00
Τέφρα	7,50
Ασβέστιο	0,85
Φώσφορο	0,65
Νάτριο	0,20
Βιταμίνη Α UI/Kg	10.800,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.000,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	10,0
Robenidine mg/Kg	66,0

Συστατικά: Πίτυρα Σίτου, Άλεуро Ηλιόσπορου, Τριφυλλάλεуро, Ελαιάλεуро, Κριθάρι, Πούλπα Ζαχαρότευτλων, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Σίτος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Ζύμες, Λοβοί Χαρουπιών, Μπετονίτης, βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

20 & 40
κιλά





4

Βοοτροφές

BK-1

για την πάχυνση μοσχαριών από τον απογαλακτισμό
μέχρι 6 μηνών ή μέχρι 250 κιλά ζώντος βάρους

Η **BK-1** είναι μία πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται αποκλειστικά για την εντατική πάχυνση των Μοσχαριών έως 6 μηνών ή 250 κιλά Ζώντος Βάρους. Η περίοδος αυτή, πάχυνσης των Μοσχαριών είναι η δυσκολότερη και τα ζώα έχουν ανάγκη από μια πλούσια και εκλεκτή τροφή για σωστή ανάπτυξη. Η **BK-1** εξασφαλίζει υψηλή ημερήσια αύξηση.

Πρόγραμμα διατροφής παχυνόμενων μοσχαριών με επιλογή άχυρο		BK-1
Σωματικό βάρος	άχυρο (κιλά/ζώο)	BK-1 (κιλά/ζώο)
100-150	0,500	0,50-3,00
150-200	0,750	3,750
200-250	1,000	4,500
Αλλαγή σε 4 μέρες με την τροφή BK-2 .		

Φροντίζετε, ώστε τα μοσχάρια να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	19,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	5,00
Ινώδεις ουσίες	10,00
Τέφρα	9,00
Ασβέστιο	1,20
Φώσφορο	0,70
Νάτριο	0,60
Βιταμίνη A UI/Kg	11.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	2.200,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	50,0

Συστατικά: Καλαμπόκι, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πίτυρα Σίτου, Κριθάρι, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Άλευρο Σόγιας, Σίτος, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Λοβοί Χαρουπιών, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

40
κιλά



ΒΚ - 2

για την πάχυνση μοσχαριών από 7 μηνών μέχρι 10 μηνών
ή από 250 - 450 κιλά ζώντος βάρους

Η **ΒΚ-2** είναι μία πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται αποκλειστικά για την εντατική πάχυνση των Μοσχαριών από 7 μέχρι 10 μηνών ή από 250-450 κιλά Ζωντανού Βάρους. Η **ΒΚ-2** εξασφαλίζει υψηλή ημερήσια αύξηση.

Πρόγραμμα διατροφής παχυνόμενων μοσχαριών με επιλογή άχυρο		ΒΚ-2
Σωματικό βάρος	άχυρο (κιλά/ζώο)	ΒΚ-2 (κιλά/ζώο)
250-300	1,250	5,500
300-350	1,250	5,650
350-400	1,500	6,250
400-450	1,750	6,500
Αλλαγή σε 4 μέρες με την τροφή ΒΚ-3 .		

Φροντίζετε να υπάρχει στη διάθεση των Μοσχαριών πάντοτε άφθονο και καθαρό νερό, διότι για κάθε κιλό τροφής έχουν ανάγκη 3-4 κιλά νερό. Εφαρμόστε με προσοχή το πρόγραμμα κτηνιατρικής πρόληψης και θεραπείας.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	17,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,50
Ινώδεις ουσίες	11,50
Τέφρα	9,00
Ασβέστιο	1,20
Φώσφορος	0,60
Νάτριο	0,60
Βιταμίνη Α UI/Kg	5.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.500,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	50,0

Συστατικά: Καλαμπόκι, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πίτυρα Σίτου,Κριθάρι, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Άλευρο Σόγιας, Σίτος, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Λοβοί Χαρουπιών, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.



40
κιλά



ΒΚ - 3

για την πάχυνση μοσχαριών από 11 μηνών μέχρι τη σφαγή
ή από 450 - 700 κιλά ζωντανού βάρους

Η **ΒΚ-3** είναι μία πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται αποκλειστικά για την εντατική πάχυνση των Μοσχαριών από 11 μέχρι την Σφαγή ή από 450 - 700 κιλά Ζωντανού Βάρους. Η **ΒΚ-3** εξασφαλίζει υψηλή ημερήσια αύξηση κι άριστη ποιότητα κρέατος.

Πρόγραμμα διατροφής παχυνόμενων μοσχαριών με επιλογή άχυρο		ΒΚ-3
Σωματικό βάρος	άχυρο (κιλά/ζώο)	ΒΚ-3 (κιλά/ζώο)
450-500	2,000	6,750
500-550	2,250	7,250
550-600	2,250	8,000
600-650	2,500	8,250
650-700	2,500	8,250

Φροντίζετε να υπάρχει στη διάθεση των Μοσχαριών πάντοτε άφθονο και καθαρό νερό, διότι για κάθε κιλό τροφής έχουν ανάγκη 3-4 κιλά νερό. Εφαρμόστε με προσοχή το πρόγραμμα κτηνιατρικής πρόληψης και θεραπείας.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	15,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,50
Ινώδεις ουσίες	11,50
Τέφρα	9,00
Ασβέστιο	1,20
Φώσφορος	0,60
Νάτριο	0,60
Βιταμίνη Α UI/Kg	5.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.500,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	50,0

Συστατικά: Καλαμπόκι, Κριθάρι, Σίτος, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πίτυρα Σίτου, Λούπινο, Άλευρο Σόγιας, Ελαιάλευρο, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Λοβοί Χαρουπιών, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία .

40
κιλά





BK - 4

για τη γαλακτοπαραγωγή των αγελάδων

Η **BK-4** προορίζεται για την διατροφή των Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής. Η **BK-4** χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν οι Αγελάδες στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους. Χορηγούμε ένα (1) κιλό τροφής **BK-4** για κάθε 2,5 κιλά γάλα. Παράδειγμα: εάν η βασική καθημερινή τροφή από τη βοσκή ή τις συγκομιζόμενες τροφές καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των Αγελάδων και δίνουν 5 κιλά γάλα τότε δίνετε ένα (1) κιλό τροφής **BK-4** για κάθε 2,5 κιλά γάλα που οι Αγελάδες παράγουν επιπλέον.

Καθημερινή Γαλακτοπαραγωγή

Τροφή BK-4

Έως 6 Kg γάλα
5,0-7,5 Kg
7,5-10,0 Kg
10,0-12,5 Kg
12,5-15,0 Kg
15,0-17,5 Kg
17,5-20,0 Kg
20,0-22,5 Kg

Σανοί κλπ
1 Kg
2 Kg
3 Kg
4 Kg
5 Kg
6 Kg
7 Kg

Φροντίζετε να υπάρχει στη διάθεση των Μοσχαριών πάντοτε άφθονο και καθαρό νερό, διότι για κάθε κιλό τροφής έχουν ανάγκη 3-4 κιλά νερό. Εφαρμόστε με προσοχή το πρόγραμμα κτηνιατρικής πρόληψης και θεραπείας.

Περιεκτικότητα

	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	18,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	4,50
Ινώδεις ουσίες	12,50
Τέφρα	9,00
Ασβέστιο	1,00
Φώσφορος	0,80
Νάτριο	0,60
Βιταμίνη A UI/Kg	5.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.500,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	50,0

Συστατικά: Πίτυρα Σίτου, Κριθάρι, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Τριφυλλάλευρο, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Λούπινο, Πούλπα Ζαχαρότευτλων, Ελαιάλευρο, Σίτος, Καλαμπόκι, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Λοβοί Χαρουπιών, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

40
κιλά



5

Χοιροτροφές



ΧΚ-2

για τον κανονικό απογαλακτισμό και την προπάχυνση των χοιριδίων
από την 35η/63η ημέρα μέχρι την 91η ημέρα από τον τοκετό

Η Χοιροτροφή **ΧΚ-2** είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους. Χορηγείται κατά βούληση στα νεαρά χοιρίδια. Ταΐζεται την τροφή **ΧΚ-2** από την 5^η εβδομάδα (35^η ημέρα) μέχρι τον απογαλακτισμό στο τέλος της 8ης / 9ης εβδομάδας (56η/63η ημέρα).

Ενδεικτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα Διατροφής ανά χοιρίδιο

Ηλικία σε ημέρες από τοκετό	35	42	49	54	63	70	77	84	91
Βάρος ζώντων χοιριδίων (κιλά)	8	10	14	17	22	27	31	37	42
Γραμμ. ανά ημέρα	500	650	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100

Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12.00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	18.50
Ολικές λιπαρές ουσίες	3.00
Ινώδεις ουσίες	4.00
Τέφρα	6.50
Ασβέστιο	1.00
Φώσφορο	0.75
Νάτριο	0.20
Λυσίνη	1.20
Μεθειονίνη	0.40
Βιταμίνη Α UI/Kg	8.400,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.600,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	150,0

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Κριθάρι, Πίτουρα Σίτου, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

40
κιλά



ΧΚ - 3

για την πάχυνση των χοίρων στο πρώτο στάδιο πάχυνσης από την 92η ημέρα μέχρι την 133η ημέρα

Η Χοιροτροφή **ΧΚ-3** είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται για το Αρχικό Στάδιο Πάχυνσης των Χοίρων (από την 92η ημέρα μέχρι την 133η ημέρα (14η-19η εβδομάδα). Η τροφή χορηγείται κατά βούληση. Οι Χοίροι πρέπει να έχουν την τροφή **ΧΚ-3** στη διάθεση τους όλη την ημέρα.

Ενδεικτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα Διατροφής ανά χοιρίδιο

Ηλικία σε ημέρες από τοκετό	91	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Βάρος ζώντων χοιριδίων (κιλά)	42	49	57	66	73	80	90	98	105	110
Γραμμ. ανά ημέρα	2.10	2.40	2.65	2.85	3.00	3.15	3.30	3.40	3.50	3.55

Η μέση κατανάλωση για την αναφερόμενη περίοδο είναι 115 Κιλά Χοιροτροφή **ΧΚ-3**.

Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείται τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

Περιεκτικότητα

Υγρασία	% 12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	15,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,00
Ινώδεις ουσίες	6,00
Τέφρα	6,00
Ασβέστιο	0,70
Φώσφορο	0,60
Νάτριο	0,25
Λυσίνη	0,85
Μεθειονίνη	0,30
Βιταμίνη Α UI/Kg	8.400,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.600,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	150,0

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Κριθάρι, Πίτυρα Σίτου, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Οξυνιστής, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

40
κιλά



ΧΚ - 4

για την πάχυνση των χοίρων στο δεύτερο στάδιο πάχυνσης από την 134η ημέρα μέχρι τη σφαγή, την 185η ημέρα

Η Χοιροτροφή **ΧΚ-4** είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται αποκλειστικά για το Τελικό Στάδιο Πάχυνσης των Χοίρων από την 134η ημέρα μέχρι την Σφαγή (180η ημέρα 20η-26η εβδομάδα). Οι Χοίροι πρέπει να έχουν την τροφή **ΧΚ-4** στη διάθεση τους όλη την ημέρα και να τρώνε ανεμπόδιστα όσο θέλουν, διαφορετικά να εφαρμόσετε το παρακάτω πρόγραμμα διατροφής.

Ενδεικτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα Διατροφής ανά χοιρίδιο

Ηλικία σε ημέρες από τοκετό	120	130	140	150	160	170	180
Βάρος ζώντων χοιριδίων (κιλά)	66	73	80	90	98	105	110
Γραμμ. ανά ημέρα	2.85	3.00	3.15	3.30	3.40	3.50	3.55

Η μέση κατανάλωση για την αναφερόμενη περίοδο είναι 165 Κιλά Χοιροτροφή **ΧΚ-4**.

Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείται τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	16,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,00
Ινώδεις ουσίες	6,00
Τέφρα	6,50
Ασβέστιο	0,90
Φώσφορος	0,75
Νάτριο	0,20
Λυσίνη	1,00
Μεθειονίνη	0,30
Βιταμίνη Α UI/Kg	8.400,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.600,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	150,0

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Κριθάρι, Πίτυρα Σίτου, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πούλπα Εσπεριδοειδών, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Οξυνιστής, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

40
κιλά





ΧΚ - 6

για τη διατροφή των χοιρομητέρων ξηράς περιόδου και εγκυμοσύνης, των χοιρομητέρων σε γαλουχία και των κάπρων

Η Χοιροτροφή **ΧΚ-6** είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται αποκλειστικά: 1. Για τις Χοιρομητέρες ξηράς περιόδου και εγκυμοσύνης. 2. Για τις Χοιρομητέρες σε γαλουχία (θηλασμό). 3. Για τους Κάπρους.

Διατροφικό Σχήμα Χοιρομητέρων

Φάση	Τροφή	Ημέρες	Κύκλος Χ/Μ - Κύκλος 1-3	Ποσ. Τροφής Κύκλος 4-7
Εγκυμοσύνη	ΧΚ-6	1-84	2,4	2,5
	ΧΚ-6	85-110	3,4	3,5

Μεταφορά στο θάλαμο τοκετών

Τοκετός Γαλουχία	ΧΚ-6	111-112	3,00	
	ΧΚ-6	113	2,50	
	ΧΚ-6	114	2,00	
	ΧΚ-6	115	0,50	
	ΧΚ-6	1	2,00	
	ΧΚ-6	2	3,00	
	ΧΚ-6	3	3,50	
	ΧΚ-6	4-8	4,00-6,00	
Ημέρα απογ/σμού	ΧΚ-6	9-56	4,50 + 0,60	Ανά χοιρίδιο
Ξηρά περίοδος	ΧΚ-6	57/63	0,00	
Κάπροι	ΧΚ-7		2,50	3,50

Φροντίζετε να υπάρχει στη διάθεση των χοιρομητέρων πάντοτε άφθονο και καθαρό νερό. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

Περιεκτικότητα

	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	16,50
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,00
Ινώδεις ουσίες	8,00
Τέφρα	6,50
Ασβέστιο	0,90
Φώσφορο	0,75
Νάτριο	0,20
Λυσίνη	1,00
Μεθειονίνη	0,30
Βιταμίνη Α UI/Kg	12.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	2.000,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	60,0

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Κριθάρι, Πίτουρα Σίτου, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Οξυνιστής, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

40
κιλά



6

Αλογοτροφές



ΑΛ - 620

τροφή για τη συντήρηση και μέτρια άσκηση των αλόγων

Η **ΑΛ-620** χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχει το άλογο. Χορηγείται σε τουλάχιστον 2 γεύματα την ημέρα.

Ενδεικτική Διατροφή :

Για Άλογα Ιππασίας ή για Άλογα με έντονη Εργασία βάρους 300 έως 400 κιλά: χορηγούμε 350 γρ. έως 500 γρ. τροφής **ΑΛ-620** ανά 100 κιλά βάρους σε συνδυασμό με 1 έως 1,5 κιλά σανού βρώμης ανά 100 κιλά βάρους πριν από την τροφή. Π.χ. Άλογο βάρους 300 κιλών, **ΑΛ-620** από 350X3=1.050 γρ. μέχρι 500X3=1.500 γρ., Σανός Βρώμης από 1X3=3 κιλά μέχρι 1,5X3= 4,5 κιλά.

Για Φοράδες Εγκυμονούσες 9-11 μηνών: χορηγούμε 650 γρ. έως 1.000 γρ. τροφής **ΑΛ-620** ανά 100 κιλά βάρους σε συνδυασμό με 1 έως 1,5 κιλά σανού βρώμης ανά 100 κιλά βάρους πριν από την τροφή.

Για Θηλάζουσες Φοράδες: κατά τους πρώτους 3 μήνες χορηγούμε 1.000 γρ. έως 1.250 γρ. τροφής **ΑΛ-620** ανά 100 κιλά βάρους σε συνδυασμό με 1 έως 1,5 κιλά σανού βρώμης ανά 100 κιλά βάρους πριν από την τροφή.

Για τα Πουλάρια: χορηγούμε 450 γρ. τροφής **ΑΛ-620** για κάθε 50 κιλά βάρους καθώς και 500 γρ. σανού βρώμης και μηδικής σε αναλογία 1:1 σε ποσότητα 500 γρ. ανά 50 κιλά βάρους.

Φροντίζετε να έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους τα άλογα άφθονο και καθαρό νερό. Για κάθε κιλό τροφής έχουν ανάγκη 3-4 κιλά νερό. Εφαρμόστε με προσοχή το κτηνιατρικό πρόγραμμα πρόληψης και θεραπείας.

Περιεκτικότητα

	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	12,50
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,50
Ινώδεις ουσίες	17,00
Τέφρα	9,00
Ασβέστιο	1,30
Φώσφορο	0,45
Νάτριο	0,55
Βιταμίνη Α UI/Kg	9.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.800,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	115,0

Συστατικά: Τριφυλλάλευρο, Κριθάρι, Πίτουρα Σίτου, Ελαιάλευρο, Σίτος, Πούλπα Ζαχαρότευτλων, Βρώμη, Λοβοί Χαρουπιών, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

40
κιλά





ΑΛ - 629

για άλογα ιππασίας

Η **ΑΛ-629** χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχει το άλογο.

Διατροφή - Ποσότητα:

Για Άλογα Ιππασίας ή Άλογα με έντονη Εργασία, βάρους 300 μέχρι 400 κιλά: χορηγούμε 850 γρ. έως 1.000 γρ. τροφής **ΑΛ-629** ανά 100 κιλά βάρους σε συνδυασμό με 1 έως 1,5 κιλά σανού βρώμης ανά 100 κιλά βάρους πριν από την τροφή. Π.χ. Άλογο βάρους 300 κιλών, **ΑΛ-629** από $850 \times 3 = 2.550$ γρ. μέχρι $1.000 \times 3 = 3.000$ γρ., Σανός Βρώμης από $1 \times 3 = 3$ κιλά μέχρι $1,5 \times 3 = 4,5$ κιλά.

Για Φοράδες Εγκυμονούσες 9-11 μηνών: χορηγούμε 500 γρ. έως 1.000 γρ. τροφής **ΑΛ-629** ανά 100 κιλά βάρους σε συνδυασμό με 1 έως 1,5 κιλά σανού βρώμης ανά 100 κιλά βάρους πριν από την τροφή.

Για Θηλάζουσες Φοράδες: κατά τους πρώτους 3 μήνες χορηγούμε 1.000 γρ. έως 1.250 γρ. τροφής **ΑΛ-629** ανά 100 κιλά βάρους σε συνδυασμό με 1 έως 1,5 κιλά σανού βρώμης ανά 100 κιλά βάρους πριν από την τροφή.

Για τα Πουλάρια: χορηγούμε 450 γρ. τροφής **ΑΛ-629** για κάθε 50 κιλά βάρους καθώς και 500 γρ. σανού βρώμης και μηδικής σε αναλογία 1:1 σε ποσότητα 500 γρ. ανά 50 κιλά βάρους.

Φροντίζετε να έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους τα άλογα άφθονο και καθαρό νερό. Για κάθε κιλό τροφής έχουν ανάγκη 3-4 κιλά νερό. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.

Περιεκτικότητα

	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	15,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	4,50
Ινώδεις ουσίες	15,00
Τέφρα	9,00
Ασβέστιο	1,40
Φώσφορος	0,70
Νάτριο	0,40
Βιταμίνη Α UI/Kg	7.500,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	1.800,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	115,0

Συστατικά: Τριφυλλάλευρο, Πίτυρα Σίτου, Κριθάρι, Βρώμη, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πούλπα Ζαχαρότευτλων, Σίτος, Λοβοί Χарουπιών, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

40
κιλά



7

Σαλιγκαροτροφές



SALIG - 01

για την αναπαραγωγή των εδώδιμων σαλιγκαριών
HELIX ASPERSA

Η τροφή **SALIG-1** είναι πλήρης τροφή από φυτικές πρώτες ύλες μη γενετικά τροποποιημένες σε αλεύρι. Προορίζεται για την αναπαραγωγή των εδώδιμων σαλιγκαριών του είδους *Helix aspersa* (Κρητικός Χοχλιός). Η τροφή χορηγείται στα σαλιγκάρια κατά βούληση. Η χορήγηση της τροφής σε αυτό το στάδιο γίνεται καθημερινά.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	10,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	15,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	5,50
Ινώδεις ουσίες	3,50
Τέφρα	29,50
Ασβέστιο	10,00
Φώσφορο	0,90
Λυσίνη	0,90
Νάτριο	0,20
Βιταμίνη A UI/Kg	14.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	2.500,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	25,0

Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης κατά την εκτροφή των σαλιγκαριών.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Άλευρο Σόγιας, Ανθρακικό Ασβέστιο, Σίτος, Άλευρο Ηλιόσπορου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Ζύμες, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

20
κιλά



SALIG - 02

για την ανάπτυξη των εδώδιμων σαλιγκαριών
HELIX ASPERSA

Η τροφή **SALIG-2** είναι πλήρης τροφή από φυτικές πρώτες ύλες μη γενετικά τροποποιημένες σε αλεύρι. Προορίζεται για την ανάπτυξη των εδώδιμων σαλιγκαριών του είδους *Helix aspersa* (Κρητικός Χοχλός). Η τροφή χορηγείται στα σαλιγκάρια κατά βούληση. Η χορήγηση της τροφής σε αυτό το στάδιο να γίνεται καθημερινά.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	10,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	16,50
Ολικές λιπαρές ουσίες	4,00
Ινώδεις ουσίες	2,50
Τέφρα	35,00
Ασβέστιο	12,00
Φώσφορος	1,20
Λυσίνη	1,40
Νάτριο	0,20
Βιταμίνη A UI/Kg	14.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	2.500,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	25,0

Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης κατά την εκτροφή των σαλιγκαριών.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Άλευρο Σόγιας, Ανθρακικό Ασβέστιο, Σίτος, Άλευρο Ηλιόσπορου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Ζύμες, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.



20
κιλό



SALIG - 03

για την πάχυνση εδώδιμων σαλιγκαριών
HELIX ASPERSA

Η τροφή **SALIG-3** είναι πλήρης τροφή από φυτικές πρώτες ύλες μη γενετικά τροποποιημένες σε αλεύρι. Προορίζεται για την πάχυνση των εδώδιμων σαλιγκαριών του είδους *Helix aspersa* (Κρητικός Χοχλιός). Η τροφή χορηγείται στα σαλιγκάρια κατά βούληση. Η χορήγηση της τροφής σε αυτό το στάδιο γίνεται καθημερινά.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	10,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	15,50
Ολικές λιπαρές ουσίες	2,50
Ινώδεις ουσίες	3,00
Τέφρα	35,00
Ασβέστιο	12,00
Φώσφορος	1,10
Λυσίνη	1,00
Νάτριο	0,20
Βιταμίνη A UI/Kg	14.000,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	2.500,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	25,0

Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης κατά την εκτροφή των σαλιγκαριών.

Συστατικά: Καλαμπόκι, Άλευρο Σόγιας, Ανθρακικό Ασβέστιο, Σίτος, Άλευρο Ηλιόσπορου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Ζύμες, Μπετονίτης, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

20
κιλά



8

Τροφές για
Κυνήγι



Πέρδικα - 1

για την ανάπτυξη των νεοσσών

A. Ορτύκια - Πέρδικες από την 1^η μέχρι την 21^η ημέρα

B. Φασιανοί από την 1^η μέχρι τη 14^η ημέρα

Η τροφή **ΠΕΡΔΙΚΑ-1** είναι μια πλήρης τροφή, σε Τραχανά και προορίζεται για τους Νεοσσούς

A. Πέρδικες – Ορτύκια

Διατροφή: από την 1η μέχρι την 21η ημέρα (0-3 εβδομάδες).

Ποσότητα: ανά ημέρα 10-15 γραμμάρια. Συνολικά περιόδου 210-315 γραμμάρια.

B. Φασιανοί

Διατροφή: από την 1η μέχρι την 14η ημέρα (0-2 εβδομάδες).

Ποσότητα: ανά ημέρα 15-20 γραμμάρια. Συνολικά περιόδου 210-280 γραμμάρια.

Φροντίζετε να έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους οι Πέρδικες, τα Ορτύκια και οι Φασιανοί, άφθονο και καθαρό νερό. Εφαρμόστε με προσοχή το πρόγραμμα κτηνιατρικής πρόληψης και θεραπείας.

Πέντε (5) ημέρες πριν τη σφαγή των Νεοσσών να διακόπτετε την χορήγηση της **ΠΕΡΔΙΚΑ-1** και να δίνετε την **ΠΕΡΔΙΚΑ-5** χωρίς Κοκκιδιοστατικό.

Περιεκτικότητα

	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	28,50
Ολικές λιπαρές ουσίες	5,00
Ινώδεις ουσίες	5,00
Τέφρα	8,00
Ασβέστιο	1,30
Φώσφορο	1,00
Νάτριο	0,20
Λυσίνη	1,60
Μεθειονίνη	0,65
Βιταμίνη A UI/Kg	13.200,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.900,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	26,5
3a890 Χλωριούχος Χολίνη mg/kg	450,0
Νατριούχος λασалоοσίδη A mg/Kg	120,0

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πίτυρα Σίτου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία, Πρόμειγμα Κοκκιδιοστατικού.

20
κιλά



Πέρδικα - 2

για την ανάπτυξη των νεοσσών

A. Ορτύκια - Πέρδικες από την 22η μέχρι την 49η ημέρα

B. Φασιανοί από την 15η μέχρι τη 42η ημέρα

Η τροφή **ΠΕΡΔΙΚΑ-2** είναι μια πλήρης τροφή σε Τραχανά και προορίζεται για:

A. Πέρδικες – Ορτύκια

Διατροφή: από την 22η μέχρι την 49η ημέρα (4-7 εβδομάδες).

Ποσότητα: ανά ημέρα 15-20 γραμμάρια. Συνολικά περιόδου 420-560 γραμμάρια.

B. Φασιανοί

Διατροφή: από την 15η μέχρι την 42η ημέρα (3-6 εβδομάδες).

Ποσότητα: ανά ημέρα 25-30 γραμμάρια. Συνολικά περιόδου 875-1.050 γραμμάρια.

Δίδετε την τροφή αυτή μετά την τροφή **ΠΕΡΔΙΚΑ-1** ανάπτυξης νεοσσών. Φροντίζετε να έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους οι Πέρδικες, τα Ορτύκια και οι Φασιανοί, άφθονο και καθαρό νερό. Εφαρμόστε με προσοχή το πρόγραμμα κτηνιατρικής πρόληψης και θεραπείας.

Πέντε (5) ημέρες πριν τη σφαγή των Νεοσσών να διακόπτετε την χορήγηση της **ΠΕΡΔΙΚΑ-2** και να δίνετε την **ΠΕΡΔΙΚΑ-5** χωρίς Κοκκιδιοστατικό.

Περιεκτικότητα

	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	27,50
Ολικές λιπαρές ουσίες	6,00
Ινώδεις ουσίες	5,00
Τέφρα	7,50
Ασβέστιο	1,20
Φώσφορο	0,90
Νάτριο	0,15
Λυσίνη	1,50
Μεθειονίνη	0,65
Βιταμίνη A UI/Kg	13.200,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.900,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	26,5
3a890 Χλωριούχος Χολίνη mg/kg	450,0
Νατριούχος λαλαλοσίδη A mg/Kg	120,00

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πίτυρα Σίτου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία, Πρόμειγμα Κοκκιδιοστατικού.



20
κιλά



Πέρδικα - 3

για την ανάπτυξη των νεοσσών

A. Ορτύκια - Πέρδικες από την 50η μέχρι την 77η ημέρα

B. Φασιανοί από την 43η μέχρι τη 105η ημέρα

Η τροφή **ΠΕΡΔΙΚΑ-3** είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους (2,5 χιλ.) ή Τραχανά και προορίζεται για:

A. Πέρδικες – Ορτύκια

Διατροφή: από την 50η μέχρι την 77η Ημέρα (8-11 εβδομάδες).

Ποσότητα: ανά ημέρα 25-30 γραμμάρια. Συνολικά περιόδου 700-840 γραμμάρια.

B. Φασιανοί

Διατροφή: από την 43η μέχρι την 105η Ημέρα (7-15 εβδομάδες).

Ποσότητα: ανά ημέρα 40-50 γραμμάρια. Συνολικά περιόδου 2.240-2.800 γραμμάρια.

Δίδετε την τροφή αυτή μετά την τροφή **ΠΕΡΔΙΚΑ-2** ανάπτυξης νεοσσών. Φροντίζετε να έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους οι Πέρδικες, τα Ορτύκια και οι Φασιανοί, άφθονο και καθαρό νερό. Εφαρμόστε με προσοχή το πρόγραμμα κτηνιατρικής πρόληψης και θεραπείας.

Πέντε (5) ημέρες πριν τη σφαγή των Νεοσσών να διακόπτετε την χορήγηση της **ΠΕΡΔΙΚΑ-3** και να δίνετε την **ΠΕΡΔΙΚΑ-5** χωρίς Κοκκιδιοστατικό.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	23,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	4,00
Ινώδεις ουσίες	4,50
Τέφρα	6,50
Ασβέστιο	1,10
Φώσφορο	0,75
Νάτριο	0,15
Λυσίνη	1,30
Μεθειονίνη	0,50
Βιταμίνη A UI/Kg	13.200,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.900,0
Βιταμίνη E (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	26,5
3a890 Χλωριούχος Χολίνη mg/kg	450,0
Νατριούχος λαλαοσίδη A mg/Kg	120,0

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πίτυρα Σίτου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία, Πρόμειγμα Κοκκιδιοστατικού.



Πέρδικα - 4

για την ανάπτυξη των πουλάδων Α. Ορτύκια - Πέρδικες από την 78^η ημέρα μέχρι την προετοιμασία για την αυγοπαραγωγή
Β. Φασιανοί από την 106^η μέχρι την προετοιμασία για την αυγοπαραγωγή

Η τροφή **ΠΕΡΔΙΚΑ - 4** είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους (2,5 χιλ.) ή Τραχανά και προορίζεται να ετοιμάσει τους Νεοσσούς να γίνουν Πουλάδες Αυγοπαραγωγής.

Α. Πέρδικες – Ορτύκια

Διατροφή: από την 78^η Ημέρα (από την 12^η εβδομάδα) μέχρι την προετοιμασία για την Αυγοπαραγωγή.

Ποσότητα: να τρώνε όσο θέλουν.

Β. Φασιανοί

Διατροφή: από την 106^η (από την 16^η εβδομάδα) μέχρι την προετοιμασία για την Αυγοπαραγωγή.

Ποσότητα: να τρώνε όσο θέλουν.

Δίνετε την τροφή αυτή μετά την τροφή **ΠΕΡΔΙΚΑ-3** ανάπτυξης νεοσσών. Φροντίζετε να έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους οι Πέρδικες, τα Ορτύκια και οι Φασιανοί, άφθονο και καθαρό νερό. Εφαρμόστε με προσοχή το πρόγραμμα κτηνιατρικής πρόληψης και θεραπείας.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	19,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,00
Ινώδεις ουσίες	5,00
Τέφρα	7,00
Ασβέστιο	1,10
Φώσφορο	0,75
Νάτριο	0,15
Λυσίνη	0,90
Μεθειονίνη	0,40
Βιταμίνη Α UI/Kg	13.200,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.900,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	26,5
3a890 Χλωριούχος Χολίνη mg/kg	450,0

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πίτουρα Σίτου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.



20 & 40
κιλά



Πέρδικα - 5

για τις πουλάδες αυγοπαραγωγής
Πέρδικες - Ορτύκια - Φασιανοί

Η τροφή **ΠΕΡΔΙΚΑ - 5** είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους (2,5 χιλ.) ή Τραχανά και προορίζεται να ετοιμάσει τους Νεοσσούς να γίνουν Πουλάδες Αυγοπαραγωγής.

Πέρδικες - Ορτύκια - Φασιανοί:

Διατροφή: Μέχρι 6 Εβδομάδες πριν την έναρξη της Αυγοπαραγωγής.

Ποσότητα: να τρώνε όσο θέλουν.

Φροντίζετε να έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους οι Πέρδικες, τα Ορτύκια και οι Φασιανοί, άφθονο και καθαρό νερό. Εφαρμόστε με προσοχή το πρόγραμμα κτηνιατρικής πρόληψης και θεραπείας.

Περιεκτικότητα	%
Υγρασία	12,50
Ολικές αζωτούχες ουσίες	14,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	3,50
Ινώδεις ουσίες	5,50
Τέφρα	7,00
Ασβέστιο	1,45
Φώσφορο	0,70
Νάτριο	0,15
Λυσίνη	0,70
Μεθειονίνη	0,30
Βιταμίνη Α UI/Kg	13.500,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	2.000,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	25,0
3a890 Χλωριούχος Χολίνη mg/kg	500,0

Συστατικά: Καλαμπόκι, Σίτος, Άλευρο Σόγιας, Άλευρο Ηλιόσπορου, Πίτυρα Σίτου, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.

20 & 40
κιλά



Πέρδικα - 6

προετοιμασία των πουλάδων πριν την έναρξη
της αυγοπαραγωγής
Πέρδικες - Ορτύκια - Φασιανοί

Η τροφή **ΠΕΡΔΙΚΑ - 6** είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους 2,5 χιλ.
ή Τραχανά.

Διατροφή: Τις τελευταίες 6 Εβδομάδες πριν την έναρξη της
Αυγοπαραγωγής. Προετοιμάζει τις Πουλάδες Πέρδικες - Ορτύκια
- Φασιανούς για μια σωστή και πλούσια Αυγοπαραγωγή.

Ποσότητα: να τρώνε όσο θέλουν.

Δίδετε την τροφή αυτή μετά την τροφή **ΠΕΡΔΙΚΑ-5** για Πουλάδες
Αυγοπαραγωγής. Φροντίζετε να έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους
οι Πέρδικες, τα Ορτύκια και οι Φασιανοί, άφθονο και καθαρό νερό.
Εφαρμόστε με προσοχή το πρόγραμμα κτηνιατρικής πρόληψης
και θεραπείας.

Περιεκτικότητα

	%
Υγρασία	14,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	4,00
Ολικές λιπαρές ουσίες	10,00
Ινώδεις ουσίες	23,00
Τέφρα	2,75
Ασβέστιο	0,90
Φώσφορο	2,20
Λυσίνη	1,40
Μεθειονίνη	0,60
Βιταμίνη Α UI/Kg	10.200,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.300,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	61,5

Συστατικά: Αραβόσιτος, Σόγια, Σιτάρι, Βήτες, Ηλιόπιτα,
Σόγια, Φωσφορικό Μονασβέστιο, Μαρμαρόσκονη, Φυτικό
Λίπος, Αλάτι, Σόδα, Πρέμιξ βιτ. και Ιχνοστοιχεία.



20 & 40
κιλά

Πέρδικα - 7

για την αυγοπαραγωγή
Πέρδικες - Ορτύκια - Φασιανοί

Η τροφή **ΠΕΡΔΙΚΑ - 7** είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους 2,5 χιλ. ή Τραχανά. Προορίζεται για τις Πέρδικες, Ορτύκια και Φασιανοί, Αυγοπαραγωγής.

A. Πέρδικες – Ορτύκια

Διατροφή: Όλη την περίοδο της Αυγοπαραγωγής.

Ποσότητα: ανά ημέρα 30-40 γραμμάρια.

B. Φασιανοί

Διατροφή: Όλη την περίοδο της Αυγοπαραγωγής.

Ποσότητα: ανά ημέρα 80-100 γραμμάρια.

Δίδετε την τροφή αυτή μετά την τροφή **ΠΕΡΔΙΚΑ - 6** Πουλάδων πριν την Αυγοπαραγωγή. Φροντίζετε να έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους οι Πέρδικες, τα Ορτύκια και οι Φασιανοί, άφθονο και καθαρό νερό.

Εφαρμόστε με προσοχή το πρόγραμμα κτηνιατρικής πρόληψης και θεραπείας.

Περιεκτικότητα

	%
Υγρασία	14,00
Ολικές αζωτούχες ουσίες	2,70
Ολικές λιπαρές ουσίες	11,60
Ινώδεις ουσίες	22,00
Τέφρα	3,20
Ασβέστιο	0,85
Φώσφορο	3,00
Λυσίνη	1,25
Μεθειονίνη	0,47
Βιταμίνη Α UI/Kg	13.500,0
Βιταμίνη D3 UI/Kg	3.000,0
Βιταμίνη Ε (α - Τοκοφερόλη) UI/Kg	80,0

Συστατικά: Αραβόσιτος, Σόγια, Σιτάρι, Βήτες, Ηλιόπιτα, Σόγια, Φωσφορικό Μονασβέστιο, Μαρμαρόσκονη, Φυτικό Λίπος, Αλάτι, Σόδα, Πρέμιξ βιτ. και Ιχνοστοιχεία.



20 & 40
κιλά






πλούσιο σε
ΕΛΑΙΚΟ ΟΞΥ
ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ
ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Η προσθήκη του ελαιαλεύρου στη ζωοτροφή μπορεί να αυξήσει το επίπεδο Ελαϊκού Οξέος και των Ακόρεστων Λιπαρών Οξέων στα προϊόντα των ζώων (κρέας, γάλα, αυγά).




Το ελαιοάλευρο είναι ένα υποπροϊόν της παραγωγής ελαιολάδου. Λαμβάνεται μετά την εκχύλιση του πυρήνα της ελιάς και την αφαίρεση του ξύλου (κουκούτσι).

Χημική σύσταση



68,6% των συνολικών λιπαρών είναι Ελαιικό Οξύ

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη




Ινώδεις ουσίες

ΛΙΓΝΙΝΗ % DM




NDF % DM




ADF % DM




PDI μηρυκαστικά



Ανόργανα στοιχεία



Ανώτερη προτεινόμενη συμμετοχή



Λιπαρά οξέα

	%ΞΟ	%Λίπος
C 12:0	-	-
C 14:0	-	-
C 16:0	0,56	9,70
C 16:1	0,04	0,70
C 18:0	0,19	3,30
C 18:1	3,95	68,60
C 18:2	0,35	6,07
C 18:3	0,67	11,60

Αμινοξέα

	%ΞΟ
Met	0,25
M+C	0,46
Lys	0,59
Threo	0,57
Tripto	1,03
Ile	0,57
Val	1,30
Arg	0,94

Ενεργειακή αξία

UFL	0,53
UFV	0,43
ΠΕ Χοιρομητέρων (kcal/kg ΞΟ)	1.510
ΠΕ Χοίρων (kcal/kg ΞΟ)	1.145
ΠΕ Κουνέλι (kcal/kg ΞΟ)	1.640
ΜΕ κουνέλι (kcal/kg ΞΟ)	1.620



delights of Crete

Δεν περιέχει κάποιο αντι-διαιπτικό παράγοντα.
Οι τιμές βασίζονται σε αναλύσεις της περιόδου 2016-2017.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Εθν. Βενιζέλου 40, Σούδα, Κρήτη, 73200
τηλ. 2821081380, fax 2821089898, e-mail: nef@mills.gr
www.mills.gr



ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΑ – ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εθν. Βενιζέλου 40, Σούδα, Χανιά, 73200, τηλ: 28210 81380, fax: 28210 89898, info@mills.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

5ο χλμ Ηρακλείου-Μαϊνάδων, Ηράκλειο, 71500, τηλ: 2810 316106-7, fax: 2810 316105, lea@mills.gr

ΑΘΗΝΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1η παρ. Αγ. Σοφίας, Θέση Σπιθάρια, Ασπρόπυργος, Αθήνα, 19300, τηλ: 210 5596382-3, fax: 210 5593929, mae@mills.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

3ο χλμ Συμμαχικής Οδού Ωραιόκαστρου-Διαβατών, Ωραιόκαστρο, Θεσ/κη, 57013, τηλ: 2310 723190, fax: 2310 689475, bkr@mills.gr